

# Clofen<sup>®</sup>

Diclofenac

1,8 mg/ml Suspensión Oral. Uso Pediátrico



**FÓRMULA:** Cada ml contiene: Diclofenac Acido Libre (Equivalente a 10,19 mg de Diclofenac potásico).....9,0 mg, Azúcar.....1.600,00 mg, Propilenglicol.....125,00 mg, Vehículo.....c.s.

**VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** Oral.

**INDICACIONES:** Tratamiento de las afecciones que cursan con inflamación y/o dolor de intensidad leve a moderada. Tratamiento de la fiebre.

**POSOLÓGIA:** Niños mayores de 1 año: 0,5 mg – 2 mg/Kg./día, repartidos cada 8 a 12 horas. (1,8 mg/ml de Diclofenac Acido Libre es equivalente a 2,04 mg de Diclofenac Potásico).

**ADVERTENCIAS:** Producto de uso delicado que debe ser administrado bajo vigilancia médica. El paciente debe informar al médico de cualquier efecto indeseable, especialmente en casos de trastornos del tracto digestivo. No exceda la dosis prescrita. Manténgase este y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños. No descarte el estuche. Este producto no debe administrarse en pacientes con intolerancia a la sacarosa (equivalente a todos los azúcares).

**PRECAUCIONES:** Enfermedades gastrointestinales, asma, insuficiencia renal, hepática o cardíaca. Los AINES pueden enmascarar infecciones o inhibir temporalmente la agregación plaquetaria. Porfiria. Depleción del volumen extracelular. Los trastornos del S.N.C. pueden influir sobre la capacidad para conducir vehículos o manejar maquinarias. Si es necesario un tratamiento prolongado, se recomienda el control periódico de la función hepática, renal y hematológica. Su administración por cualquier vía debe ser restringida en pacientes con enfermedad del tracto digestivo, si es indispensable su uso el médico tratante debe tomar todas las medidas para proteger la vía digestiva contra la posibilidad de recidivas de afecciones gastrointestinales. Realizar control hematológico, del funcionalismo hepático y renal. Adminístrese con precaución en pacientes diabéticos.

**EFFECTOS ADVERSOS:** Gastrointestinales: Dispepsia, náuseas, vómitos, pirosis, flatulencia, diarrea, úlcera gástrica. Hematológica: Anemia aplásica y hemolítica, agranulocitosis y trombocitopenia. Neurológicas: Cefalea y vértigo. Otras: Erupciones cutáneas y prurito, Mareo, aumento de las transaminasas en suero.

**INTERACCIONES:** Con litio, digoxina, metotrexate, ciclosporinas, diuréticos, anticoagulantes, hipoglicemiantes orales y quinolonas.

**CONTRAINDICACIONES:** Hipersensibilidad al Diclofenac u otros AINES. Úlcera gastroduodenal e insuficiencia hepática o renal.

**CONSERVACIÓN:** Consérvese a temperatura inferior a 30°C, en lugar fresco y seco.

**MODO DE USO:** Agítese bien antes de usar, si no se homogeniza no se administre el producto.

**PRESENTACIÓN:** Frasco por 60 ml de 1,8 mg/ml. E.F. 33.581/11.

**FARMACÉUTICO PATROCINANTE:** Dra. María Alcira Rivero Prieto.

Producto de Especialidades DOLLDER, C.A.

RIF.: J-00117472-9. Caracas - República Bolivariana de Venezuela.


Para mayor información comunicarse con la Dirección Médica de Especialidades Dollder, C.A.

Teléfonos: (0212) 400.54.00 ó al 0800 DOLLDER / 0800 3655337

23728-1

TIRO

FECHA: 31 - 05 - 11    CORRECCIÓN: 31 - 07 - 13  
TAMAÑO: 125 (ancho) x 145 (alto) mm  
COLOR: Negro

 asesores gráficos F&S c.a.