

Cynt®

Simvastatina

20 mg Comprimidos Recubiertos

40 mg Comprimidos Recubiertos

80 mg Comprimidos Recubiertos

especialidades



Dolder c.a.

FÓRMULA: Cada comprimido recubierto de 20 mg contiene: Simvastatina 20 mg, Lactosa Monohidrato 107,170 mg. Cada comprimido de 40 mg contiene: Simvastatina 40 mg; Lactosa Monohidrato 230,83 mg y Cada comprimido de 80 mg contiene: Simvastatina 80 mg; Lactosa Monohidrato 469,83 mg.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.

INDICACIONES: Tratamiento de la hipercolesterolemia (hiperlipidemia tipo III y IV de Fredrickson). Prevención y tratamiento asociado a cardiopatía isquémica en pacientes con alto riesgo. Reducción del riesgo de accidentes cerebro vasculares isquémicos e isquemia cerebral transitoria. Disminución en las concentraciones elevadas de colesterol LDL en hipercolesterolemia primaria, cuando ha sido insuficiente la respuesta a la dieta y las otras medidas no farmacológicas solas. Disminución de las concentraciones elevadas de colesterol en pacientes con hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia combinadas, cuando la hipercolesterolemia es la anomalía más importante.

POSOLÓGIA: 10 – 40 mg una vez al día y 80 mg/día como dosis máxima en aquellos pacientes donde la terapia convencional no reduzca los niveles de colesterol a valores normales.

Dosis usual: 10 mg/día en una sola dosis por la noche. En casos severos reajustar la dosis, incrementando a intervalos no menores de 4 semanas hasta un máximo de 40 mg 1 vez al día. En pacientes que reciben simultáneamente medicamentos inmunosupresores, la dosis máxima es de: 10 mg/día. Antes de iniciar el tratamiento y durante el mismo se debe someter al paciente a una sola dieta estándar reductora del colesterol.

ADVERTENCIAS: Producto de uso delicado que debe ser administrado bajo estricta vigilancia médica. No se administre durante el embarazo o cuando se sospeche su existencia ni durante el período de lactancia. En caso de ser imprescindible su uso por no existir otra alternativa terapéutica suspéndase temporalmente la lactancia materna mientras dure el tratamiento. No sobrepase la dosis prescrita. Manténgase este y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños. No descarte el estuche.

Estos productos contienen Lactosa y no debe administrarse en pacientes con intolerancia a la lactosa o galactosa.

PRECAUCIONES: Pacientes con insuficiencia renal secundaria a rhabdomiólisis, hipotensión arterial, cirugía mayor, traumatismos, trastornos metabólicos endocrinos, electrolíticos e infecciones agudas graves. Este producto puede ocasionar aumento de las transaminasas (en pacientes con disfunción hepática deben ser monitoreadas periódicamente) y de la creatinofosfoquinasa (CPK), por lo que es obligatoria su evaluación trimestral si se usa la dosis de 80 mg/día. La CPK puede aumentar significativamente si se asocia al tratamiento con inmunosupresores. En pacientes que presentan miopatías, debe evaluarse la posibilidad de rhabdomiólisis y reconsiderarse la suspensión del tratamiento. Insuficiencia hepática. No administrarse con comidas o antiácidos.

Se deben realizar pruebas en funcionalismo hepático antes de iniciar el tratamiento y durante el mismo. En pacientes que presenten signos o síntomas de trastornos musculares (miopatía) debe suspenderse temporalmente el tratamiento. Dado que se ha descrito un incremento de la incidencia de diabetes Mellitus tipo 2 asociado al uso prolongado de estatinas, es recomendable en pacientes con terapias crónicas realizar con periodicidad exámenes que permitan detectar oportunamente, de ser el caso, dicha eventualidad. En pacientes ya diabéticos se debe vigilar más frecuentemente la Glicemia y extremar las medidas de control de la enfermedad.

TIRO

FECHA: 03 - 05 - 11 CORRECCIÓN: 25 - 04 - 12
TAMAÑO: 125 (ancho) x 145 (alto) mm
COLOR: Negro



asesores gráficos F&S c.a.

Cynt[®]

Simvastatina

20 mg Comprimidos Recubiertos

40 mg Comprimidos Recubiertos

80 mg Comprimidos Recubiertos

especialidades



Dollder c.a.

EFFECTOS ADVERSOS: Xerostomía, anorexia, náuseas, vómitos, dispepsia, dolor abdominal, diarrea, estreñimiento, flatulencia, hepatitis, ictericia colestásica, miopatías, calambres musculares, rabdomiolisis, mareos, visión borrosa, trastornos del sueño, cefaleas, prurito, necrólisis epidérmica tóxica, eritema multiforme, mialgias, vasculitis, leucopenia, eosinofilia, anemia hemolítica, fotosensibilidad y fiebre.
Artralgias, vértigo, parestesia, neuropatía periférica, ansiedad, insomnio, depresión.

INTERACCIONES: Digoxina, Propanolol, Warfarina, Inmunosupresores, Genfibrozil, Claritromicina, Itraconazol, Ketoconazol, Acido Nicotínico, Eritromicina, Inhibidores de la proteasa del HIV y Nefazodona: aumentan el riesgo de miopatía y rabdomiolisis. Derivados Cumarínicos: aumentan el tiempo de protrombina.

CONTRAINDICACIONES: En pacientes alérgicos a la Simvastatina. Pacientes pediátricos. Insuficiencia hepática y/o renal aguda. Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula.

CONSERVACIÓN: Consérvase a temperatura inferior a 30°C en lugar fresco y seco.

PRESENTACIÓN: Estuches con 20 y 30 comprimidos de 20 mg, 10 y 30 comprimidos de 40 mg y 10 comprimidos de 80 mg. E.F. 33.257/11, E.F. 33.255/11, E.F. 33.256/11.


FARMACÉUTICO PATROCINANTE: Dra. María Alcira Rivero Prieto.

Producto de Especialidades DOLLDER, C.A.
RIF.: J-00117472-9. Caracas - República Bolivariana de Venezuela.
Para mayor información comunicarse con la Dirección Médica de Especialidades Dollder, C.A.
Teléfonos: (0212) 400.54.00 ó al 0800 DOLLDER / 0800 3655337

23735-1

RETIRO

FECHA: 03 - 05 - 11 CORRECCIÓN: 25 - 04 - 12
TAMAÑO: 125 (ancho) x 145 (alto) mm
COLOR: Negro

 asesores gráficos F&S c.a.