

Dolak[®]

Ketorolac Trometamina

10 mg Comprimidos

20 mg Comprimidos Recubiertos



FÓRMULA: Cada comprimido 10 mg contiene: Ketorolac Trometamina 10 mg; Lactosa 102,60 mg, Excipientes c.s.
Cada comprimido recubierto 20 mg contiene: Ketorolac Trometamina 20 mg; Lactosa 112,98 mg, Excipientes c.s.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Comprimidos de administración Oral.

INDICACIONES: Analgesia a corto plazo en el dolor post-operatorio.

POSOLÓGIA: Comprimidos: Dosis Inicial: 10 mg - 30 mg/día. Mantenimiento: 10 mg cada 4 - 6 horas. Dosis Máxima: 90 mg/día.

ADVERTENCIAS: Producto de uso delicado que sólo debe ser administrado bajo estricta vigilancia médica. No se administre durante el embarazo o cuando se sospeche su existencia. Tampoco se administre durante el período de lactancia. No sobrepase la dosis prescrita. Informar al médico de cualquier efecto indeseable especialmente en caso de trastornos del aparato digestivo. Manténgase fuera del alcance de los niños.
Los comprimidos no deben administrarse en pacientes con intolerancia a la lactosa o galactosa.

PRECAUCIONES: Pacientes con insuficiencia renal, antecedentes de úlceras pépticas, trastornos hepáticos, pacientes geriátricos, con síntomas de retención de fluido, edema periférico, hipertensión, descompensación cardíaca, coagulopatías o pacientes que tomen anticoagulantes orales o heparina.

Pacientes con insuficiencia cardíaca.

Pacientes con alteraciones hepáticas, renales.

Pacientes con volumen sanguíneo renal disminuido.

Su uso prolongado se ha asociado con una mayor incidencia de reacciones adversas severas.

EFECTOS ADVERSOS: Edema, somnolencia, vértigo, cefalea, sudoración, hipotensión, náuseas, dispepsia, dolor gastrointestinal, constipación, diarrea, estomatitis, sensación de plenitud gastrointestinal, flatulencia, vómito. Úlceras pépticas. Rash y prurito. Reacciones de hipersensibilidad como anafilaxis, broncoespasmo, edema laríngeo, edema de lengua, rubor. Convulsiones, vértigo, tremor, trastornos del sueño, alucinaciones, euforia, insomnio. Disnea, asma, edema pulmonar. Úlcera péptica, hemorragias gastrointestinales, perforación gastrointestinal, melena, sangramiento rectal, gastritis, eructos, anorexia, aumento del apetito. Hepatitis, insuficiencia hepática, ictericia colestásica. Palpitaciones, palidez, rubor, síncope. Insuficiencia renal aguda, oliguria, nefritis, azoemia.

INTERACCIONES: No usar conjuntamente con heparina o anticoagulantes orales. No administre con warfarina.

CONTRAINDICACIONES: Alergia al Ketorolac u otros AINES, hipertensión, asma, insuficiencia renal, úlcera péptica, menores de 18 años, embarazo, pacientes tratados con sales de litio, deshidratación.

CONSERVACIÓN: Consérvese a temperatura entre 15 °C - 30 °C, resguárdese de la luz, en lugar fresco y seco.

TIRO

FECHA: 12 - 05 - 11 CORRECCIÓN: 29 - 07 - 22
TAMAÑO: 125 (ancho) x 145 (alto) mm
COLOR: Negro

asesores gráficos F&S c.a.

Dolak[®]

Ketorolac Trometamina

10 mg Comprimidos

20 mg Comprimidos Recubiertos

especialidades



Dollder c.a.

PRESENTACIÓN: Estuche conteniendo 20 comprimidos de 10 mg. E.F. 27.426/17.
Estuche conteniendo 10 comprimidos recubiertos de 20 mg. E.F. 27.438/17.

VENTA CON PRESCRIPCIÓN FACULTATIVA.

FARMACÉUTICO PATROCINANTE: Dra. María Alcira Rivero Prieto.

Producto de Especialidades DOLLDER, C.A.
RIF.: J-00117472-9. Caracas - República Bolivariana de Venezuela.
Para mayor información comunicarse con la Dirección Médica de Especialidades Dollder, C.A.
Teléfonos: (0212) 400.54.00 ó al 0800 DOLLDER / 0800 3655337. www.dollder.net

237414

RETIRO

FECHA: 12 - 05 - 11 CORRECCIÓN: 29 - 07 - 22
TAMAÑO: 125 (ancho) x 145 (alto) mm
COLOR: Negro

 asesores gráficos F&S c.a.