

Dompesin®

Domperidona

10 mg Comprimidos



FÓRMULA: Cada comprimido contiene: Domperidona 10,00 mg; Lactosa Monohidratada 109,558 mg; Excipientes c.s.p.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.

INDICACIONES: Tratamiento de trastornos dispépticos asociados con evacuación gástrica lenta o reflujo esofágico. Náuseas y vómitos de diversa etiología, reflujo gastroesofágico y esofagitis.

POSOLOGÍA: Niños mayores de 12 años y adultos: 10 mg cada 8 horas, 15 minutos a 30 minutos antes de las comidas. *Dosis Máxima:* 80 mg / día.

ADVERTENCIAS: Producto de uso delicado que sólo debe ser administrado bajo estricta vigilancia médica. No se administre durante el embarazo o cuando se sospeche su existencia, ni durante la lactancia, a menos que a criterio médico el balance riesgo/beneficio sea favorable. De ser indispensable su uso por no existir otra alternativa terapéutica, suspéndase temporalmente la lactancia materna mientras dure el tratamiento. No exceda la dosis prescrita. Manténgase este y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños. No descarte el estuche. Contiene Lactosa, no debe administrarse en pacientes con intolerancia a la lactosa o galactosa.

PRECAUCIONES: Ajustar la dosis en pacientes que reciben concomitantemente cimetidina. En pacientes con disfunción hepática y/o renal. Este producto debe ser administrado durante cortos periodos de tiempo, ya que ocasiona aumento de los niveles plasmáticos de la hormona estimulante de la tiroides y la prolactina. Los niveles altos de prolactina en sangre han sido asociados con galactorrea, amenorrea, ginecomastia e impotencia sexual reversible.

CONTRAINDICACIONES: Alergia a la Domperidona o a los componentes de la fórmula. Hemorragia, obstrucción mecánica o perforación gastrointestinal.

EFFECTOS ADVERSOS: Aumento de los niveles plasmáticos de prolactina. Con baja frecuencia puede ocasionar galactorrea o ginecomastia, amenorrea, cólicos abdominales, diarrea. Efectos extrapiramidales, erupción cutánea, urticaria.

INTERACCIONES: Antiácidos, bicarbonato de sodio, antsecretorios (cimetidina). Anticolinérgicos, codeína, morfina, dopamina, levodopa, derivados atropínicos. Inhibidores de la enzima **CYP3A4** (ketoconazol, eritromicina, ritonavir, nefazodona).

CONSERVACIÓN: Consérvese a temperatura menor de 30°C en lugar fresco y seco.

PRESENTACIÓN: Estuche con 30 y 60 comprimidos. E.F. 36.325/14.

VENTA CON PRESCRIPCIÓN FACULTATIVA.


FARMACÉUTICO PATROCINANTE: Dra. María Alcira Rivero Prieto.

Producto de Especialidades DOLLDER, C.A.
RIF: J-00117472-9. Caracas - República Bolivariana de Venezuela.
Para mayor información comunicarse con la Dirección Médica de Especialidades Dollder, C.A.
Teléfonos: (0212) 400.54.00 ó al 0800 DOLLDER / 0800 3655337

23822-1

TIRO

FECHA: 08 - 10 - 13 CORRECCIÓN: 25 - 03 - 15
TAMAÑO: 125 (ancho) x 145 (alto) mm
COLOR: Negro

 asesores gráficos F&S c.a.