

Fazol®

Secnidazol

500 mg Gránulos para Suspensión Oral

500 mg Comprimidos Recubiertos

especialidades



Dollder c.a.

FÓRMULA: Cada comprimido contiene: Secnidazol 500 mg, Excipientes c.s.p.
Cada frasco de Suspensión contiene: Secnidazol 500 mg, Aspartame 50 mg, Sacarosa 5.799,40 mg; excipientes c.s.p.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.

INDICACIONES: Tratamiento de la amebiasis intestinal, giardiasis y tricomonirosis.

POSOLÓGIA: Comprimidos: Adultos: 2 g diarios dosis única. Gránulos para suspensión 500 mg: Niños mayores de 2 años: 30 mg/Kg/dosis única. Adultos: 2 g diarios dosis única.

ADVERTENCIAS: Producto de uso delicado que solo debe ser administrado bajo estricta vigilancia médica. No se administre durante el embarazo o cuando se sospeche su existencia, ni durante la lactancia. En caso de ser imprescindible su uso por no existir otra alternativa terapéutica, suspéndase temporalmente la lactancia materna. No se administre en menores de 2 años. Durante el tratamiento con esta sustancia, no deben ingerirse bebidas alcohólicas. Manténgase fuera del alcance de los niños. No exceda la dosis prescrita. La suspensión contiene Sacarosa, por lo cual, no debe administrarse en pacientes con intolerancia a la Sacarosa (equivalente a todos los azúcares).

PRECAUCIONES: Enfermedad orgánica activa del sistema nervioso central, discrasia sanguínea, disfunción cardíaca, disfunción hepática. La suspensión contiene: Sacarosa (equivalente a todos los azúcares), debe administrarse con precaución en pacientes diabéticos. Además, contiene Aspartame y debe administrarse con precaución en pacientes fenilcetonúricos.

EFFECTOS ADVERSOS: Hematológicos: neutropenia reversible; Neurológicos: convulsiones, neuropatía periférica, mareos, vértigo, incoordinación, ataxia, irritabilidad, confusión, depresión, insomnio, cefaleas, síncope. Gastrointestinales: Náusea vómito, anorexia, diarrea, epigastralgia, cólico abdominal, sabor metálico, lengua saburral, glositis, estomatitis. Génitourinarias: cistitis, poliurea, disuria, tenesmo vesical, coloración pardusca de la orina. Dermatológicas: erupción, eritema, urticaria.

INTERACCIONES: Alcohol, barbitúricos, corticosteroides, cimetidina, litio, disulfiram, fluoracilo, anticoagulantes orales.

CONTRAINDICACIONES: Alergia al Secnidazol. Niños menores de 2 años. Discrasia sanguínea severa, insuficiencia hepática severa.

CONSERVACIÓN: Consérvese a temperatura inferior a 30°C.

PRESENTACIÓN: Estuche conteniendo 4 comprimidos de 500 mg. E.F. 31.167/10.
Frasco conteniendo 7 g de polvo para reconstituir 15 ml. E.F. 31.168/10.


FARMACÉUTICO PATROCINANTE: Dra. María Alcira Rivero Prieto.

Producto de Especialidades DOLLDER, C.A.
RIF.: J-00117472-9. Caracas - República Bolivariana de Venezuela.
Para mayor información comunicarse con la Dirección Médica de Especialidades Dollder, C.A.
Teléfonos: (0212) 400.54.00 ó al 0800 DOLLDER / 0800 3655337

23744-1

TIRO

FECHA: 29 - 06 - 11 CORRECCIÓN: 15 - 11 - 12
TAMAÑO: 125 (ancho) x 145 (alto) mm
COLOR: Negro

 asesores gráficos F&S c.a.