

# Fungosin®

Itraconazol

100 mg Cápsulas



**FÓRMULA:** Cada cápsula contiene: Itraconazol 100 mg; Sacarosa 60,9 mg; Excipientes c.s.

**VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** Oral.

**INDICACIONES:** Dermatofitosis cutánea (tiña corporis, tiña cruris, tiña pedis y tiña manum), pitiriasis versicolor y candidiasis vulvo vaginal.

**POSOLOGÍA:** Tiña corporis y Tiña cruris: 100 mg/día durante 15 días. Tiña manum y Tiña pedis: 100 mg/día durante 30 días. Pitiriasis versicolor: 200 mg/día durante 7 días. Candidiasis vulvo vaginal: 400 mg/día durante 1 día.

**EFFECTOS ADVERSOS:** Dispepsia, náuseas, dolor abdominal, estreñimiento. Pirosis, cefalea, vértigo, vómito. Erupciones cutáneas, urticaria. Hipergliceridemia, hipopotasemia. Hipertensión.

**ADVERTENCIAS:** Producto de uso delicado que debe ser administrado bajo vigilancia médica. No se administre durante el embarazo o cuando se sospeche su existencia. Ni durante el período de lactancia. En caso de ser imprescindible su uso por no existir otra alternativa terapéutica suspéndase temporalmente la lactancia materna mientras dure el tratamiento. No exceda la dosis prescrita. Manténgase este y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños. No descarte el estuche. Este producto no debe administrarse en pacientes con intolerancia a la sacarosa (equivalente a todos los azúcares).

**PRECAUCIONES:** En pacientes con enfermedades hepáticas conocidas. Pacientes con deficiencia cardíaca congestiva. Este producto contiene sacarosa, adminístrese con precaución en pacientes diabéticos.

**INTERACCIONES:** Con rifampicina y ciclosporinas. No se administre conjuntamente con warfarina, digoxina; terfenadina, astemizol. Fenilhidantoína y carbamazepina. Antagonistas de los receptores H2. Claritromicina, ritonavir, indinavir; Cisapride, triazolam, midazolam oral, Quinidina, pimoziide, anticoagulantes orales, verapamil, alprazolam y metilprednisolona. Simvastatina y lovastatina.

**CONTRAINDICACIONES:** Hipersensibilidad a la droga y a otros antimicóticos azólicos. Pacientes pediátricos.

**CONSERVACIÓN:** Consérvese a temperatura menor de 30°C en lugar fresco y seco.

**PRESENTACIÓN:** Estuche conteniendo 4, 6, 14, 15 y 28 cápsulas. E.F. 27.057/12.

**FARMACÉUTICO PATROCINANTE:** Dra. María Alcira Rivero Prieto.

Producto de Especialidades DOLLDER, C.A.  
RIF.: J-00117472-9. Caracas - República Bolivariana de Venezuela.  
Para mayor información comunicarse con la Dirección Médica de Especialidades Dollder, C.A.  
Teléfonos: (0212) 400.54.00 ó al 0800 DOLLDER / 0800 3655337

23748-1

TIRO

FECHA: 18 - 08 - 11    CORRECCIÓN: 02 - 11 - 12  
TAMAÑO: 125 (ancho) x 145 (alto) mm  
COLOR: Negro