

Heprox[®]

Tamsulosina Clorhidrato

0,4 mg Cápsulas de Liberación Prolongada



FÓRMULA: Cada Cápsula contiene: Tamsulosina HCl 0,40 mg; Sacarosa 142,22 mg; Excipientes c.s.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.

INDICACIONES: Tratamiento de la hiperplasia prostática benigna, en aquellos casos en que la cirugía está contraindicada.

POSOLÓGIA: Adulto: Una cápsula al día, normalmente después del desayuno.

ADVERTENCIA: Producto de uso delicado que debe ser administrado bajo estricta vigilancia médica. No exceda la dosis prescrita. Manténgase este y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños. No descarte el estuche. Este producto no debe administrarse en pacientes con intolerancia a la sacarosa (equivalente a todos los azúcares). Antes de administrar este producto, leer el prospecto interno.

PRECAUCIONES: Como otros bloqueante alfa 1, puede presentarse hipotensión en algunos casos aislados. Pacientes que reciben tratamiento antihipertensivo, ya que se han descrito casos de hipotensión ortostática con el uso del mismo. Deben realizarse pruebas de funcionalismo hepático/renal. Debe ser usado con precaución en pacientes con insuficiencia renal severa (clearance menor a 10 ml/min). Este producto contiene sacarosa, adminístrese con precaución en pacientes diabéticos.

EFFECTOS ADVERSOS: Mareos, eyaculación anormal (trastornos de eyaculación), cefalea (raramente 2%), astenia e hipotensión postural, palpitaciones y rinitis. Ocasionalmente reacciones gastrointestinales tipo náuseas, vómito, diarrea y constipación. Reacciones alérgicas tipo rash, prurito y urticaria. Raramente síncope y muy raramente priapismo. A los primeros síntomas de hipotensión ortostática el paciente deberá sentarse o acostarse hasta que los síntomas hayan desaparecido. Otros efectos secundarios: somnolencia, disfunción sexual.

INTERACCIONES: Los alimentos disminuyen la biodisponibilidad de la Tamsulosina. No administrar conjuntamente con Cimetidina, Oxilofrina, Warfarina, Diclofenac. Otros medicamentos: Atenolol, Metoprolol, Sotalol, Propanolol, Prazosina, Doxazosina, Terazosina, Verapamil, Diltiazem, Nifedipina.

CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula. No se administre en pacientes con hipersensibilidad a la Tamsulosina. En pacientes con historial de hipotensión ortostática e insuficiencia hepática severa. Pacientes con insuficiencia renal.

CONSERVACIÓN: Consérvese a temperatura menor de 30°C, en lugar fresco y seco.

CON PRESCRIPCIÓN FACULTATIVA.

PRESENTACIÓN: Estuche con 30 cápsulas LP. E.F. N° 36.675/14.

FARMACÉUTICO PATROCINANTE: Dra. María Alcira Rivero Prieto.

Producto de Especialidades DOLLDER, C.A.

RIF: J-00117472-9. Caracas - República Bolivariana de Venezuela.


Para mayor información comunicarse con la Dirección Médica de Especialidades Dollder, C.A.

Teléfonos: (0212) 400.54.00 ó al 0800 DOLLDER / 0800 3655337

23751-1

TIRO

FECHA: 18 - 08 - 11 CORRECCIÓN: 08 - 06 - 15
TAMAÑO: 125 (ancho) x 145 (alto) mm
COLOR: Negro

 asesores gráficos F&S c.a.