

# Idoxen<sup>®</sup>

Venlafaxina

75 mg Cápsulas de Liberación Prolongada



**FÓRMULA:** Cada cápsula de L.P. contiene:  
Venlafaxina Clorhidrato 84,86 mg (Equivalente a 75 mg base); Azúcar 27,50 mg; Excipientes c.s.

**VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** Oral.

**INDICACIONES:** Tratamiento de la depresión mayor y de los trastornos de ansiedad generalizada.

**POSOLÓGIA:** Adultos y ancianos: 75 mg – 150 mg / día, administrada con las comidas.

**ADVERTENCIAS:** Producto de uso delicado que debe ser administrado bajo estricta vigilancia médica. No se administre durante el embarazo o cuando se sospeche su existencia, ni durante la lactancia, a menos que el balance riesgo / beneficio sea favorable. En caso de ser indispensable su uso por no existir otra alternativa terapéutica suspéndase definitivamente la lactancia materna. No exceda la dosis prescrita. Este producto contiene azúcar. Antes de administrarlo, leer el prospecto interno.

**PRECAUCIONES:** En pacientes con disfunción renal (filtración glomerular menor de 30 ml/min) y/o hepática (valorado por un tiempo de protrombina entre 14-18 seg.) se recomienda reducir la dosis en un 50%. Aun cuando los estudios clínicos no han demostrado síntomas y/o signos de abstinencia al suspender el tratamiento, se recomienda la disminución gradual de la dosis luego de una semana de tratamiento, en especial en pacientes tratados con dosis elevadas o durante largo tiempo (seis semanas o más). La dosis debe ser titulada con gran precaución en ancianos. Este producto contiene azúcar, adminístrese con precaución en pacientes diabéticos.

**EFFECTOS ADVERSOS:** Cefalea, mareo, xerostomía, insomnio, somnolencia, nerviosismo, convulsiones, anorexia, constipación, náusea, vómito, disfunción sexual, sudoración, astenia, fotosensibilidad, diaforesis, hipertensión arterial, activación de trastornos maniacos.

**INTERACCIONES:** Cimetidina, diazepam, haloperidol, litio, imipramina, alcohol.

**CONTRAINDICACIONES:** Hipersensibilidad a la venlafaxina. Uso concomitante con los inhibidores de la MAO. Menores de 18 años.

**CONSERVACIÓN:** Consérvese a temperatura inferior a 30°C en lugar seco.

**PRESENTACIÓN:** Estuche por 10 cápsulas L.P. E.F. 32.276/10.

**FARMACÉUTICO PATROCINANTE:** Dra. María Alcira Rivero Prieto.

Producto de Especialidades DOLLDER, C.A.  
RIF.: J-00117472-9. Caracas - República Bolivariana de Venezuela.  
Para mayor información comunicarse con la Dirección Médica de Especialidades Dollder, C.A.  
Teléfonos: (0212) 400.54.00 ó al 0800 DOLLDER / 0800 3655337

23752

TIRO

FECHA: 15 - 06 - 11    CORRECCIÓN: 03 - 08 - 11  
TAMAÑO: 125 (ancho) x 145 (alto) mm  
COLOR: Negro

asesores gráficos F&S c.a.