

Muclar®

Ambroxol / Loratadina

30 mg - 5 mg Comprimidos



FÓRMULA: Cada comprimido contiene:
Ambroxol Clorhidrato..... 30,00 mg
Loratadina..... 5,00 mg
Lactosa..... 75,794 mg
Almidón..... 10,00 mg
Excipientes..... c.s.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Vía Oral.

INDICACIONES: Tratamiento de las afecciones respiratorias que cursan con dificultad para expulsar las secreciones bronquiales asociados a procesos alérgicos.

POSOLÓGIA: Adultos y niños mayores de 12 años: Un comprimido cada 12 horas.

ADVERTENCIAS: No se administre durante el embarazo o cuando se sospeche su existencia, ni durante la lactancia, a menos que a criterio médico el balance riesgo/beneficio sea favorable.

En caso de ser imprescindible su uso por no existir otra alternativa terapéutica, suspéndase temporalmente la lactancia materna mientras dure el tratamiento.

Este producto puede producir somnolencia, sedación, confusión mental, disminución de la capacidad de concentración mental y de la actividad refleja. Evítese actividades que impliquen coordinación y estado de alerta mental. Si presenta palpitaciones o agitación psicomotriz, suspéndase y consulte al médico. Este producto no debe administrarse en pacientes con intolerancia a la Lactosa o Galactosa. Si los síntomas persisten y no se observa mejoría después de dos o tres días, con el uso de este medicamento, suspéndase y consulte al médico.

PRECAUCIONES: Pacientes que reciban terapia concomitante con antimicrobianos macrólidos y/o derivados imidazólicos. Pacientes con trastornos del funcionalismo hepático y/o renal. Al efectuarse cualquier tipo de prueba cutánea, se debe suspender aproximadamente 48 horas antes el tratamiento con este producto, ya que la Loratadina puede inhibir o disminuir la reactividad dérmica. Evítese actividades que impliquen coordinación y estados de alerta mental, como manejo de vehículos u otro tipo de maquinarias, puede producir disminución de los reflejos y sueño. La ingesta concomitante de alcohol u otros depresores del sistema nervioso central aumentan el riesgo de accidentes.

REACCIONES ADVERSAS: Neurológicas: Mareos, astenia, incoordinación, visión borrosa, diplopía, euforia, intranquilidad, insomnio y temblor, somnolencia.


Gastrointestinales: Náuseas, vómitos, estreñimiento, diarrea, anorexia.

Otros: Xeroftalmia, tos, disuria, palpitaciones, hipotensión.

INTERACCIONES: Con depresores del SNC (neurolépticos, benzodiazepinas, antidepresivos, opiáceos) y con fármacos que potencian los efectos anticolinérgicos (IMAO y antidepresivos tricíclicos), aumentando el efecto sedante. Alcohol etílico, barbitúricos y teofilina.

TIRO

FECHA: 30 - 01 - 13 CORRECCIÓN: 27 - 05 - 22
TAMAÑO: 125 (ancho) x 145 (alto) mm
COLOR: Negro



Muclar®

Ambroxol / Loratadina

30 mg - 5 mg Comprimidos



CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula, glaucoma, estenosis pilórica, retención urinaria, enfermedades cardíacas congénitas, hipertensión arterial, insuficiencia hepática, hipertiroidismo.

CONSERVACIÓN: Consérvase en lugar fresco y seco, a temperatura inferior a 30°C.

PRESENTACIÓN: Estuche conteniendo 10 Comprimidos. E.F. 40.642/21.

FARMACÉUTICO PATROCINANTE: Dra. María Alcira Rivero Prieto.

Producto de Especialidades DOLLDER, C.A.
RIF.: J-00117472-9. Caracas - República Bolivariana de Venezuela.
Para mayor información comunicarse con la Dirección Médica de Especialidades Dollder, C.A.
Teléfonos: (0212) 400.54.00 ó al 0800 DOLLDER / 0800 3655337. www.dollder.net

23625-1

RETIRO

FECHA: 30 - 01 - 13 CORRECCIÓN: 27 - 05 - 22
TAMAÑO: 125 (ancho) x 145 (alto) mm
COLOR: Negro