

Nemodine®

Nimodipina

30 mg Comprimidos Recubiertos

40 mg Comprimidos Recubiertos

especialidades



Dollder c.a.

FÓRMULA: Cada comprimido recubierto de 30 mg contiene: Nimodipina 30 mg. Y cada comprimido recubierto de 40 mg contiene: Nimodipina 40 mg. Excipientes c.s.p.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.

INDICACIONES: Profilaxis y tratamiento del deterioro neurológico isquémico producido por vasoespasmo cerebral posterior a hemorragia subaracnoidea, de origen aneurismático. Tratamiento de la función cerebral alterada en ancianos con síntomas pronunciados, como pérdida de la memoria, marcha, concentración y labilidad emocional. Insuficiencia Cerebrovascular aguda. Tratamiento del vértigo.

POSOLÓGIA: Profilaxis y tratamiento del deterioro neurológico isquémico producido por vasoespasmo cerebral posterior a hemorragia subaracnoidea, de origen aneurismático: 90 – 360 mg/día, vía oral, en dosis fraccionadas cada 4 a 6 horas.

Tratamiento de la función cerebral alterada en ancianos con síntomas pronunciados, como pérdida de la memoria, marcha, concentración y labilidad emocional: 90 – 240 mg/día, vía oral, en dosis fraccionadas cada 4 a 6 horas.

Accidente cerebrovascular isquémico: 120mg a 240mg al día cada 4-6 horas.

Rango posológico: 90mg – 360mg / día, según la patología. Bajo estricto criterio del médico tratante.

Tratamiento del vértigo: 30 mg/día, vía oral, cada 8 horas.

ADVERTENCIAS: Producto de uso delicado que solo debe ser administrado bajo estricta vigilancia médica. No se administre durante el embarazo o cuando se sospeche su existencia. Ni durante el período de lactancia. En caso de ser indispensable su uso por no existir otra alternativa terapéutica suspéndase definitivamente la lactancia. No exceda la dosis prescrita. Manténgase fuera del alcance de los niños. Consérvese en lugares frescos y secos, a temperaturas menores de 30°C.

PRECAUCIONES: Durante la administración del producto pueden observarse episodios de hipotensión arterial y taquicardia. Deben controlarse los niveles de transaminasas fosfatasa alcalinas y gammaglutamil-transferasa. Debe recordarse que la Nimodipina posee un significativo primer paso hepático y una extensa metabolización en ese órgano.

CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula. Insuficiencia hepática, edema cerebral generalizado o aumento de la presión intracraneala.

EFFECTOS ADVERSOS: Hipotensión, taquicardia, palpitaciones, náuseas, vómito, mareos.

INTERACCIONES: Cimetidina; administración simultánea con otros hipotensores en pacientes hipertensos.

CONSERVACIÓN: Consérvese a temperatura menor de 30°C, en lugar fresco y seco.

PRESENTACIÓN: Estuche conteniendo 20, 40 comprimidos de 30 mg. E.F. 28.707/10. Estuche conteniendo 20, 40 comprimidos de 40 mg. E.F. 31.274/10.

FARMACÉUTICO PATROCINANTE: Dra. María Alcira Rivero Prieto.

Producto de Especialidades DOLLDER, C.A.

RIF.: J-00117472-9. Caracas - República Bolivariana de Venezuela.

Para mayor información comunicarse con la Dirección Médica de Especialidades Dollder, C.A.

Teléfonos: (0212) 400.54.00 ó al 0800 DOLLDER / 0800 3655337

23768

TIRO

FECHA: 13 - 06 - 11 CORRECCIÓN: 16 - 07 - 2013
TAMAÑO: 125 (ancho) x 145 (alto) mm
COLOR: Negro

 asesores gráficos F&S c.a.