

# Novarona<sup>®</sup>

Amiodarona

200 mg Comprimidos



**FÓRMULA:** Cada comprimido contiene: Amiodarona 200 mg; Lactosa 38,75 mg; Excipientes c.s.p.

**VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** Oral.

**INDICACIONES:** Tratamiento de las arritmias complejas o en arritmias rebeldes o resistentes a otros antiarrítmicos. Arritmias ventriculares y supraventriculares, fibrilación auricular y fluter auricular.

**POSOLOGÍA:** Adultos: Fase aguda o de impregnación: 600 a 800 mg/día, durante 2 semanas. Fase de mantenimiento: 200 mg/día, con descanso el fin de semana.

**ADVERTENCIAS:** Producto de uso delicado que debe ser administrado bajo estricta vigilancia médica. No se administre durante el embarazo o cuando se sospeche su existencia o en periodo de lactancia. De ser imprescindible su uso por no existir otra alternativa terapéutica, suspéndase definitivamente la lactancia materna. La Amiodarona se acumula y presenta una vida media de 28 a 60 días, por lo cual una vez alcanzados los efectos terapéuticos deseados, se debe ajustar el esquema de dosificación, con el fin de disminuir los riesgos de toxicidad. La Amiodarona aporta 150 mg de yodo por cada 400 mg de principio activo. Durante su uso se debe realizar control periódico del funcionalismo tiroideo, respiratorio y oftalmológico.

Manténgase fuera del alcance de los niños. No exceda la dosis recomendada. Este producto no debe administrarse en pacientes con intolerancia a la lactosa o galactosa.

**PRECAUCIONES:** Hipotiroidismo, hipertensión arterial, Durante su uso deben realizarse control periódico del funcionalismo tiroideo, respiratorio y oftálmico. Precaución en pacientes que reciban  $\beta$ -bloqueantes, calcioantagonistas y anticoagulantes. No exponerse al sol durante el tratamiento.

**CONTRAINDICACIONES:** Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula. Bradicardia sinusal, bloqueo aurículo ventricular, bloqueo sinoauricular, hipotensión arterial, colapso cardiovascular, hipotiroidismo. Hipersensibilidad conocida al yodo. Embarazo y lactancia.

**REACCIONES ADVERSAS:** Oftalmológicas: Depósitos corneales, visión borrosa, disminución de la agudeza visual. Dermatológicas: Pigmentación cutánea (foto sensibilización). Endocrinas: Hipotiroidismo, hipertiroidismo. Respiratorias: Neumopatías intersticiales difusas. Neurológicas: Neuropatías periféricas sensitivo motoras, miopatías, ataxia. Gastrointestinales: Disfunción hepática, ictericia, hiperamilasemia, náusea, vómito. Renal: Disfunción Renal. Hipotensión arterial, bradicardia, bloqueo aurículo-ventricular, síndrome de distres respiratorio del adulto. Su uso durante el embarazo puede producir hipo o hipertiroidismo neonatal. Depósitos corneales, fotosensibilización, fibrosis pulmonar, neuropatía periférica. (Son dosis dependientes y desaparecen al suspender el tratamiento).

**INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS:** Betabloqueantes, bloqueantes de calcio (verapamil, diltiazem), laxantes, antiarrítmicos, astemizol, diuréticos, corticoides, anfotericina B, anticoagulantes orales, digitálicos, fenitoína, anestésicos generales, ciclosporina.

**CONSERVACIÓN:** Consérvese a temperatura menor a 30°C, en lugar fresco y seco.

TIRO

FECHA: 29 - 06 - 11    CORRECCIÓN: 18 - 04 - 12  
TAMAÑO: 125 (ancho) x 145 (alto) mm  
COLOR: Negro

**Novarona**<sup>®</sup>

*Amiodarona*

**200 mg Comprimidos**

**PRESENTACIÓN:** Estuche conteniendo 10 comprimidos. E.F. 23.563/10.

**VENTA CON PRESCRIPCIÓN FACULTATIVA.**

**FARMACÉUTICO PATROCINANTE:** Dra. María Alcira Rivero Prieto.

especialidades




Dollder c.a.

Producto de Especialidades DOLLDER, C.A.  
RIF.: J-00117472-9. Caracas - República Bolivariana de Venezuela.  
Para mayor información comunicarse con la Dirección Médica de Especialidades Dollder, C.A.  
Teléfonos: (0212) 400.54.00 ó al 0800 DOLLDER / 0800 3655337

23772-1

RETIRO

FECHA: 29 - 06 - 11    CORRECCIÓN: 18 - 04 - 12  
TAMAÑO: 125 (ancho) x 145 (alto) mm  
COLOR: Negro

 asesores gráficos F&S c.a.