

Talerc®

Cetirizina Diclorhidrato

1 mg/ml Solución Oral

especialidades



Dollder c.a.

FÓRMULA: Cada ml de la solución contiene:
Cetirizina Diclorhidrato..... 1,00 mg
Sacarina Sódica..... 1,00 mg
Excipientes..... c.s.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.

INDICACIONES: Tratamiento de rinitis y conjuntivitis estacionales, rinitis alérgicas perennes, prurito y urticaria alérgica. Antihistamínico.

POSOLOGÍA: Rango Posológico: Niños de 2 a 6 años: 0,1 mg a 0,3 mg/kg/día. Niños mayores de 6 años: 10 mg/día. A juicio del médico tratante.

ADVERTENCIAS: No se administre durante el embarazo o cuando se sospeche su existencia, ni durante la lactancia a menos que el médico lo indique. Este producto puede producir somnolencia, sedación, confusión mental, disminución de la capacidad de concentración mental y de la actividad refleja. Durante su administración evitese actividades que impliquen coordinación y estados de alerta mental. Con el uso de este producto no ingiera bebidas alcohólicas, ni sedantes. No descarte el estuche. No administrar a niños menores de 2 años. Manténgase fuera del alcance de los niños.

PRECAUCIONES: Evítense actividades que impliquen coordinación y estados de alerta mental, como manejo de vehículos u otros tipos de maquinarias. La ingesta concomitante de alcohol u otros depresores del sistema nervioso central aumentan el riesgo de accidentes. Los bloqueantes H1 interfieren con las pruebas de sensibilidad cutánea, por lo que previo a la realización de las mismas debe suspenderse la administración de antihistamínicos. Deben realizarse pruebas de funcionalismo hepático y renal. En pacientes con insuficiencia renal, la dosis debe ser reducida a la mitad de la recomendada. Deben evitarse trabajos que impliquen coordinación y estados de alerta.

CONTRAINDICACIONES: Niños menores de 2 años. Pacientes con hipersensibilidad a los componentes de la fórmula, glaucoma, estenosis pilórica, retención urinaria, enfermedad cardiovascular y diabetes mellitus.

EFFECTOS ADVERSOS: Neurológicas: mareo, astenia, incoordinación, visión borrosa, diplopía, euforia, intranquilidad, insomnio, tic, crisis oculógiras, discinesia, temblor, alucinaciones, agitación, confusión, depresión, cefalea. Gastrointestinales: Anorexia, náusea, vómito, estreñimiento o diarrea. Cardiovasculares: Palpitaciones, hipotensión arterial. Otras: Xerostomía, Xerausis de fauces y vías respiratorias, tos, polaquiuria, disuria, enuresis. Somnolencia, fatiga, boca seca, mareos.

INTERACCIONES: Alcohol Etílico, antidepresivos tricíclicos, barbitúricos y otros depresores del Sistema Nervioso Central.

CONSERVACIÓN: Consérvese a temperatura menor a 30°C, en lugar fresco y seco.

PRESENTACIÓN: Frasco por 120 ml. E.F. 33.490/11.

FARMACÉUTICO PATROCINANTE: Dra. María Alcira Rivero Prieto.

Producto de Especialidades DOLLDER, C.A.

RIF.: J-00117472-9. Caracas - República Bolivariana de Venezuela.

Para mayor información comunicarse con la Dirección Médica de Especialidades Dollder, C.A.

Teléfonos: (0212) 400.54.00 ó al 0800 DOLLDER / 0800 3655337

23790

TIRO

FECHA: 28 - 07 - 11 CORRECCIÓN: 02 - 11 - 12
TAMAÑO: 125 (ancho) x 145 (alto) mm
COLOR: Negro

 asesores gráficos F&S c.a.