

Udox[®]

Diclofenac Colestiramina

75 mg Cápsulas

especialidades



Dollder c.a.

FÓRMULA: Cada cápsula contiene: Diclofenac Colestiramina (140 mg) Equivalente a Diclofenac Sódico 75 mg; Excipientes c.s.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.

INDICACIONES: Tratamiento de las afecciones que cursan con inflamación y/o dolor de intensidad leve a moderada. Tratamiento sintomático de la migraña con o sin aura. Tratamiento sintomático de la dismenorrea primaria. Tratamiento de la fiebre.

POSOLOGÍA: 75mg – 150mg (1 ó 2 Cápsulas) al día. Dosis máxima: 150mg/día. Tratamiento de las afecciones que cursan con inflamación y/o dolor de intensidad leve a moderada: 75mg una vez al día ó 75mg Cada 12 horas. Tratamiento de la Dismenorrea primaria: 75mg cada 12 horas. Tratamiento de la fiebre: 75mg cada 12 horas. Tratamiento sintomático de la migraña con o sin aura: 75mg cada 12 horas.

ADVERTENCIAS: No se administre durante el embarazo ni cuando sospeche de su existencia, a menos que a criterio médico el balance riesgo/beneficio sea favorable. No se administre durante la lactancia, a menos que el médico lo indique. El paciente debe informar al médico cualquier efecto indeseable, especialmente en caso de trastornos del aparato digestivo.

PRECAUCIONES: Su administración por cualquier vía debe ser restringida en pacientes con enfermedad del tracto digestivo, si es indispensable su uso, el médico tratante debe tomar las medidas necesarias para proteger la vía digestiva contra la posibilidad de recidivas de afecciones gastrointestinales. Realizar control hematológico, del funcionalismo hepático y renal. Debe ajustarse la dosis en ancianos.

REACCIONES ADVERSAS: Gastrointestinales: Dispepsia, náuseas, vómito, diarrea, úlcera gástrica, pirosis, flatulencia. Hematológicas: Anemia aplásica y hemolítica, agranulocitosis y trombocitopenia. Neurológicas: Cefaléa y Vértigos. Otras: Erupciones cutáneas y prurito.

INTERACCIONES: Litio, digoxina: Puede elevar las concentraciones plasmáticas. Metotrexate: se debe tener cuidado en administrar AINES menos de 24 horas antes o después con metotrexate ya que la concentración sérica de ese fármaco puede elevarse, aumentando así su toxicidad. Ciclosporina: Los efectos de los AINES sobre las prostaglandinas renales pueden aumentar la nefrotoxicidad de la Ciclosporina. Diuréticos: Puede inhibir la actividad de los diuréticos. El tratamiento concomitante con diuréticos que evitan la pérdida de potasio puede estar asociado a la elevación de los niveles séricos de potasio que, por lo tanto, deben ser monitoreados. Anticoagulantes, hipoglicemiantes orales, quinolonas.

CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad conocida al diclofenac, a los componentes de la fórmula y a otros AINES. Úlcera gastroduodenal e insuficiencia hepática y renal. Pacientes con crisis de asma, reacciones cutáneas o inflamaciones de la mucosa nasal, precipitadas por ácido acetilsalicílico u otros fármacos con actividad inhibitoria de la prostaglandina-sintetasa. Durante el último trimestre del embarazo. Depresión de la médula ósea.

CONSERVACIÓN: Consérvese a temperatura inferior a 30°C, en lugar fresco y seco.

PRESENTACIÓN: Estuche conteniendo 10 Cápsulas. E.F. 39.978/13

FARMACÉUTICO PATROCINANTE: Dra. María Alcira Rivero Prieto.

Producto de Especialidades DOLLDER, C.A.

RIF.: J-00117472-9. Caracas - República Bolivariana de Venezuela.

Para mayor información comunicarse con la Dirección Médica de Especialidades Dollder, C.A.

Teléfonos: (0212) 400.54.00 ó al 0800 DOLLDER / 0800 3655337

23818

TIRO

FECHA: 30 - 01 - 13 CORRECCIÓN: 08 - 05 - 13
TAMAÑO: 125 (ancho) x 145 (alto) mm
COLOR: Negro


asesores gráficos F&S c.a.