

Zost[®]

Sildenafil

50 mg Comprimidos



FÓRMULA: Cada comprimido contiene: Sildenafil Citrato (equivalente a Sildenafil 50 mg) 70,24 mg; Sucralosa 2,092 mg; Excipientes c.s.p.

INDICACIONES: Tratamiento de la disfunción eréctil de cualquier etiología.

POSOLOGÍA: Adultos: 25 a 100 mg / día. Ancianos: 25 a 50 mg / día.

En general la dosis recomendada es de 50 mg, tomada aproximadamente 1 hora antes de la actividad sexual. Sin embargo puede tomarse también en cualquier momento entre 4 horas y media hora previo a la actividad sexual; teniendo en cuenta la efectividad y tolerabilidad, la dosis puede incrementarse hasta dosis máxima de 100 mg, o disminuirse a una dosis de 25 mg diarios. La frecuencia máxima de dosificación recomendada: 1 sola vez al día.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.

EFFECTOS ADVERSOS: Neurológicas: Cefalea, mareo. Cardiovasculares: Rubor, hipotensión leve transitoria. Gastroenterológicas o Digestivas: Dispepsia. Oftalmológicas: Trastornos visuales leves y transitorios como discromatopsia, fotosensibilidad o visión borrosa. Las reacciones adversas fueron de carácter leve a moderado. En orden decreciente se observó: dolor de cabeza, rubor, dispepsia, congestión nasal, infecciones del tracto urinario, trastornos visuales, diarrea, vértigo, rash cutáneo. Otras reacciones de menor incidencia fueron: infecciones del tracto respiratorio, dolor de espalda y artralgia.

ADVERTENCIAS: Previa a la administración de estos productos debe realizarse una evaluación integral del paciente para determinar la causa de la disfunción eréctil.

Su indicación en pacientes cardiopatas debe ser basado en el balance objetivo beneficio / riesgo. En pacientes geriátricos el tratamiento inicial debe ser con la dosis mínima recomendada.

Su uso concomitante con fármacos a base de dadores de oxido nítrico o nitratos produce hipotensión severa y shock. Producto de uso delicado que solo debe ser administrado bajo estricta vigilancia médica. Es importante la realización de exámenes físicos completos y revisión de la historia clínica de cada paciente. Deberá advertirse a los pacientes que el uso del medicamento no protege contra enfermedades de transmisión sexual (incluido HIV) y por lo tanto deberán tomarse las medidas protectoras necesarias. No exceda la dosis prescrita. Manténgase fuera del alcance de los niños.

INTERACCIONES: Adminístrese el Sildenafil con precaución con los inhibidores de la isoenzima citocromo P450-(3A4 / Y2C9); con Cimetidina; con Eritromicina; con Ketoconazol, Itraconazol, Mibefradil; con Inductores de CYP3A4. No se administre con medicamentos mononitrados y dinitrados y con parches de nitroglicerina.

PRECAUCIONES: El médico deberá evaluar el estado cardiovascular del paciente antes de indicar cualquier tratamiento para la disfunción eréctil.

Los medicamentos para el tratamiento de la disfunción eréctil deberán usarse con precaución en pacientes con deformaciones anatómicas peneanas (angulación, fibrosis cavernosa o enfermedad de Peyronie) o en pacientes con antecedentes al priapismo o de enfermedades que predispongan al mismo (anemia falciforme, mieloma múltiple o leucemia).

La seguridad y eficacia de la combinación de Sildenafil con otros tratamientos de la disfunción eréctil no ha sido fehacientemente comprobada por lo que no se recomienda el uso conjunto.

Utilizar con precaución en pacientes con desordenes de coagulación, úlcera péptica activa o pacientes con retinitis pigmentaria.

Pacientes que reciben tratamiento a base de antiagregantes plaquetarios. Discrasias sanguíneas. Úlcera péptica activa. Disfunción hepática y/o renal.

TIRO

FECHA: 03 - 05 - 11 CORRECCIÓN: 26 - 09 - 13
TAMAÑO: 125 (ancho) x 145 (alto) mm
COLOR: Negro

Zost[®]

Sildenafil

50 mg Comprimidos

especialidades



Dollder c.a.

CONTRAINDICACIONES: Alergia al Sildenafil o a cualquiera de los componentes de la fórmula. Uso concomitante con productos dadores de oxido nítrico o nitratos. Pacientes bajo tratamiento con mononitratos o dinitratos de Isorbide o parches de nitroglicerina.
Insuficiencia hepática y/o renal. Retinitis pigmentaria hereditaria.

CONSERVACIÓN: Consérvese a temperatura menor de 30°C en lugar fresco y seco.

VENTA CON PRESCRIPCIÓN FACULTATIVA.

PRESENTACIÓN: Estuches con 1, 2 y 4 Comprimidos. E.F. 33.888/11


FARMACÉUTICO PATROCINANTE: Dra. María Alcira Rivero Prieto.

Producto de Especialidades DOLLDER, C.A.
RIF.: J-00117472-9. Caracas - República Bolivariana de Venezuela.
Para mayor información comunicarse con la Dirección Médica de Especialidades Dollder, C.A.
Teléfonos: (0212) 400.54.00 ó al 0800 DOLLDER / 0800 3655337

23796-1

RETIRO

FECHA: 03 - 05 - 11 CORRECCIÓN: 26 - 09 - 13
TAMAÑO: 125 (ancho) x 145 (alto) mm
COLOR: Negro

 asesores gráficos F&S c.a.